

## 蒲黄炭（水烛香蒲）配方颗粒

## Puhuangtan (Shuizhuxiangpu) Peifangkeli

【来源】 本品为香蒲科植物水烛香蒲 *Typha angustifolia* L. 的干燥花粉经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取蒲黄炭饮片 7300g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（出膏率为 7~11%），加辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成 1000g，即得。

【性状】 本品为灰棕色至棕褐色的颗粒；气微，味微苦。

【鉴别】 取本品 1g，研细，加水 10ml 使溶解，滤过，滤液用水饱和的正丁醇振摇提取 2 次，每次 10ml，合并正丁醇液，蒸干，残渣加乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取蒲黄对照药材 2g，加 80%乙醇 50ml，冷浸 24 小时，滤过，滤液蒸干，残渣自“加水 10ml 使溶解”起，同法制成对照药材溶液。再取异鼠李素-3-*O*-新橙皮苷、香蒲新苷对照品，加乙醇分别制成每 1ml 各含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 通则 0502）试验，吸取上述四种溶液各 2 $\mu$ l，分别点于同一聚酰胺薄膜，以丙酮-水（1：2）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以三氯化铝试液，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【特征图谱】 照高效液相色谱法（中国药典 通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相 A，以 0.1%冰醋酸溶液为流动相 B，按下表梯度洗脱；流速为 0.3ml/min；柱温为 30℃；检测波长为 254nm。理论板数按异鼠李素-3-*O*-新橙皮苷峰计算应不低于 5000。

时间（分钟）	流动相 A（%）	流动相 B（%）
0	5	95
3	10	90
5	16	84
9	18	82
14	51	49
16	5	95

参照物溶液的制备 取蒲黄对照药材 0.5g，加水 25ml，加热回流 1 小时，放冷，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取异鼠李素-3-*O*-新橙皮苷、


## 江苏省中药配方颗粒质量标准公示稿

香蒲新苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1ml 各含 25  $\mu$ g 的混合溶液，作为对照品参照物溶液 I。再取 4-羟基苯甲酸、槲皮素-3-*O*-新橙皮苷、山柰酚-3-*O*-新橙皮苷对照品，分别加甲醇制成每 1ml 各含对羟基苯甲酸 10  $\mu$ g、槲皮素-3-*O*-新橙皮苷 25  $\mu$ g 和山柰酚-3-*O*-新橙皮苷各 25  $\mu$ g 的混合溶液，作为对照品参照物溶液 II。

**供试品溶液的制备** 取本品适量，研细，取约 0.2g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入 30% 甲醇 25ml，密塞，称定重量，超声处理（功率 250W，频率 40kHz）30 分钟，放冷，再称定重量，用 30% 甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

**测定法** 分别精密吸取参照物溶液和供试品溶液各 2  $\mu$ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱图中应呈现 8 个特征峰，应与对照药材参照物色谱图中的 8 个特征峰的保留时间相对应，其中峰 1、峰 4、峰 6、峰 7、峰 8 应分别与对照品参照物峰的保留时间相对应。峰 2、峰 3、峰 5 与 S 峰（峰 6）的相对保留时间依次约为：0.68、0.88、0.98。



蒲黄炭（水烛香蒲）对照特征图谱

峰 1：4-羟基苯甲酸 峰 4：槲皮素-3-*O*-新橙皮苷 峰 6（S 峰）：香蒲新苷 峰 7：山柰酚-3-*O*-新橙皮苷 峰 8：异鼠李素-3-*O*-新橙皮苷

色谱柱：ZORBAX Eclipse Plus C18（100mm×2.1，1.8 $\mu$ m）

**【检查】** 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典 通则 0104）。

## 江苏省中药配方颗粒质量标准公示稿

**【浸出物】** 照醇溶性浸出物测定法（中国药典 通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 10.0%。

**【含量测定】** 照高效液相色谱法（中国药典 通则 0512）测定。

**色谱条件与系统适用性试验** 同**【特征图谱】**项。

**对照品溶液的制备** 同**【特征图谱】**项下的对照品参照物溶液 I。

**供试品溶液的制备** 同**【特征图谱】**项。

**测定法** 分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各 2 $\mu$ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每 1g 含香蒲新苷( $C_{34}H_{42}O_{20}$ )和异鼠李素-3-*O*-新橙皮苷( $C_{28}H_{38}O_{16}$ )总量应为 1.0~13.0mg。

**【规格】** 每 1g 配方颗粒相当于饮片 7.3g

**【贮藏】** 密封。